

# Club de Neuro-Ophthalmologie Francophone

*Présidente : C. Vignal-Clermont*  
*Vice-président : A. Tourbah Secrétaire : C. Tilikete*  
*Trésorier : J. de Sèze*

## Aspects ophtalmologiques des méningites carcinomateuses : à propos de 4 cas

J.Ph.Woillez; Cl.Signolles; I.Drumare; S.Defoort-Dhellemmes (Lille)

La méningite carcinomateuse se définit comme un envahissement de l'espace méningé sous arachnoïdien par des cellules tumorales métastatiques. Si l'analyse des cas cliniques, à posteriori, ne pose pas particulièrement de problèmes, il nous semble que l'étude attentive des premiers signes est fondamentale pour éviter toute divagation diagnostique. La présentation de 4 cas (un enfant, deux femmes, un homme) aux âges relativement dispersés (5 ans, 17 ans, 44 ans et 69 ans) nous permet d'évoquer un certain nombre de variations dans l'expression clinique et paraclinique de cette pathologie de mauvais pronostic. Révélée par une atteinte des nerfs crâniens (majoritairement les nerfs oculomoteurs, le VII, le VIII) c'est surtout la baisse d'acuité visuelle plus ou moins rapide, bilatérale, associée à un œdème papillaire le plus souvent massif, qui doit nous faire suspecter cette origine. Après avoir rappelé les principes de cette pathologie, le diagnostic différentiel est évoqué.