

Résultats du traitement de l'amblyopie dans la cataracte congénitale

V Paire, L Raffin & A Péchereau
Nantes

Objet : Suivi d'une cohorte de patients opérés d'une cataracte congénitale.

Matériel et méthodes : étude rétrospective d'une série de 61 dossiers (96 patients). Tous les patients présentant une anomalie organique trop sévère ou qui ont été perdu de vue très rapidement ont été exclus (n : 25).

Les patients ont été divisés en quatre catégories :

- Les cataractes congénitales unilatérales précoces (n : 14), c'est-à-dire opérées avant 18 mois
- Les cataractes congénitales unilatérales tardives (n : 25), c'est-à-dire opérées après 18 mois
- Les cataractes congénitales bilatérales précoces (n : 9), c'est-à-dire opérées avant 24 mois
- Les cataractes congénitales unilatérales précoces (n : 13), c'est-à-dire opérées après 24 mois

Tous les patients ont été implantés si l'état anatomique le permettait sauf le groupe 3.

Résultats : à situation anatomique et à qualité de suivi égales, les résultats suivent deux lois simples :

- Plus la cataracte est précoce, moins le résultat est bon ;
- Plus l'asymétrie entre les deux yeux est importante, moins le résultat est bon.

De ce fait, la cataracte congénitale unilatérale précoce est la situation la plus difficile à traiter. Dans cette dernière situation et en fin de traitement, l'acuité visuelle de l'œil opéré est supérieure ou égale à 5/10 dans 57 % des cas et absence d'amblyopie relative dans 36 % des cas.

Discussion et conclusion : ces dernières années, les progrès dans la prise en charge chirurgicale de la cataracte congénitale sont incontestables. Il ne serait rien si des stratégies efficaces de rééducation de l'amblyopie n'avaient pas été mises en place. Ces dernières permettent des résultats statistiques inimaginables il y a une vingtaine d'années. Mais surtout, ce modèle véritablement expérimental d'amblyopie montre la direction qu'il faut suivre dans la prise en charge de toutes les amblyopies. La guérison de toutes les amblyopies fonctionnelles prises en charge de façon précoce est l'objectif de toute prise en charge.