

A propos de 70 cas de syndromes de Brown

N. Gambarelli, C. Lagrange, Marseille

Introduction : le but de ce travail est d'analyser les caractéristiques cliniques et thérapeutiques dans cette série de patients.

Sujets et méthodes : Nous avons repris 70 observations concernant des patients porteurs d'un tableau évocateur de syndrome de Brown. L'interrogatoire précise la date d'apparition du syndrome, congénitale, plus tardive, acquise...L'examen clinique étudie essentiellement: le torticolis, présent ou pas, en précisant son type et son importance, la déviation en position primaire, présente ou pas et sa mesure, l'étude des versions en précisant la direction et l'importance de la limitation, permettant une classification pour chaque cas. L'acuité visuelle, la recherche d'une amblyopie, la réfraction sous cycloplégique sont étudiées classiquement. La vision binoculaire est évaluée. L'examen à la LAF et le FO complètent l'examen. L'examen paraclinique associe à des degrés divers : test de Hess-Weiss, Lancaster ou paroi de Harms, imagerie cérébrale, test de duction forcée.

Résultats : ils sont détaillés : âge, sex-ratio, formes cliniques, évolution, thérapeutiques utilisées et en particulier la place de la chirurgie.

Discussion : les auteurs font référence aux données récentes de la littérature, en particulier pour la pathogénie.

Conclusion : Nous insistons sur l'importance de l'examen clinique et de la surveillance, chez ces patients où l'abstention thérapeutique est fréquente.